PRODUIT ANTI-VERRUES

Date: 26 avril 2006.

Ingrédients médicinaux:

Nom(s) propre(s)	Nom(s) commun(s)	Matière(s) d'origine
Acide salicylique (Gottschalk et McEwen 2004; USP 29; O'Neil *et al.* 2001) **Acide 2-hydroxybenzoïque** (Gottschalk et McEwen 2004; O'Neil *et al*. 2001)	**Acide salicylique** (Gottschalk et McEwen 2004; USP 29; O'Neil *et al.* 2001)	**Acide salicylique*** (Gottschalk et McEwen 2004; USP 29; O'Neil *et al.* 2001) No. CAS [000069-72-7]+
Acide lactique (Gottschalck et McEwen 2004; USP 29; O'Neil *et al.* 2001) **Acide DL-lactique** (O'Neil *et al.* 2001) **Acide 2-hydroxypropanoïque** (USP 29; O'Neil *et al.* 2001)	**Acide lactique** (Gottschalck et McEwen 2004; USP 29; O'Neil *et al.* 2001)	**Acide lactique*** (Gottschalck et McEwen 2004; USP 29; O'Neil *et al.* 2001) No. CAS [000050-21-5]+

*L'ingrédient doit respecter les normes des pharmacopées (pour une liste des normes de pharmacopées acceptables, consulter le *Compendium des monographies*) ou doit faire parti d'un dossier principal approuvé par la DPSN. Une lettre d'autorisation du propriétaire enregistré du dossier principal devra être fournie.
+Le numéro CAS peut être fourni comme information supplémentaire.
Note: Des formulations facultatives normalisées de pharmacopées sont fournies à l'**Annexe 1**.

Voie(s) d'administration: Topique (FDA 1990).

Forme(s) posologique(s): Emplâtre ou solution semblable au collodion (FDA 1990).

Usage(s) ou fin(s) recommandés:

Énoncé qui précise ce qui suit:

- Anti-verrues (FDA 1990).
- Pour enlever les verrues vulgaires (FDA 1990).
- Pour enlever les verrues plantaires sous le pied (FDA 1990).

Dose(s):

Sous-population:

Il n'est pas nécessaire de spécifier la sous-population.

Quantité:

Acide salicylique:	5 à 17 % dans une solution semblable au collodion (FDA 1990).
Acide salicylique:	15 % dans un pansement au glycol contenant de la gomme karaya (FDA 1990).
Acide salicylique:	12 à 40 % dans un autre type de pansement (FDA 1990).
Acide lactique:	30 % (Fiume 1998).

Combinaisons permises:

L'acide lactique n'est permis qu'en combinaison avec l'acide salicylique.

Mode d'emploi:

Énoncé qui précise ce qui suit:

Pour les produits préparés dans une solution semblable au collodion (FDA 1990):

1. Laver la région atteinte (**Facultatif:** Faire tremper la verrue dans de l'eau chaude durant 5 minutes) et assécher complètement.
2. Appliquer une goutte du produit à la fois de façon à couvrir suffisamment chaque verrue et laisser sécher.
3. Répéter le traitement une ou deux fois par jour au besoin (jusqu'à la disparition de la verrue).

Pour les produits préparés dans un pansement au glycol contenant de la gomme karaya (FDA 1990):

1. Laver la région atteinte (**Facultatif:** Faire tremper la verrue dans de l'eau chaude pendant 5 minutes) et assécher complètement.
2. Aplanir légèrement la surface de la verrue avec la lime en émeri fournie (FDA 1994).
3. Couper le pansement aux dimensions de la verrue (s'il y a lieu).
4. Appliquer une goutte d'eau chaude sur la verrue tout en gardant la région environnante au sec (FDA 1994).
5. Appliquer le pansement médicamenteux au coucher et laisser en place durant au moins huit heures.
6. Au matin, enlever et jeter le pansement.
7. Répéter le traitement toutes les 24 heures au besoin (jusqu'à la disparition de la verrue).

Pour les produits préparés avec d'autres types d'emplâtres (FDA 1990):

1. Laver la région atteinte (**Facultatif:** Faire tremper la verrue dans de l'eau chaude durant 5 minutes) et assécher complètement.

2. Couper le pansement aux dimensions de la verrue (s'il y a lieu).
3. Appliquer le pansement médicamenteux.
4. Répéter le traitement toutes les 48 heures au besoin (jusqu'à la disparition de la verrue).

Durée d'utilisation: Ne pas utiliser pendant plus de 12 semaines (FDA 1990).

Mentions de risque:

Énoncé qui précise ce qui suit:

Précautions et avertissements:

Pour tous les produits:
- Pour usage externe seulement (FDA 1990).
- Consulter un praticien de soins de santé si l'inconfort persiste (FDA 1990).

Pour les produits préparés dans un pansement au glycol contenant de la gomme karaya:
- Extrêmement inflammable ou inflammable ou combustible (FDA 1990).
- Tenir loin du feu ou de la flamme (FDA 1990).
- Bien refermer le flacon et entreposer à la température de la pièce, loin de la chaleur (FDA 1990).
- Si le produit est en contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau durant 15 minutes (FDA 1990).
- Éviter d'inhaler les vapeurs (FDA 1990).

Contre-indications:

Pour tous les produits:
- Ne pas utiliser ce produit sur une peau irritée ou rougie ou sur une région infectée (FDA 1990).
- Ne pas utiliser ce produit si vous souffrez de diabète ou d'une mauvaise circulation sanguine (FDA 1990).
- Ne pas appliquer sur les naevi, les taches de naissance, les verrues avec des poils, les verrues génitales ou les verrues présentes sur le visage ou sur une muqueuse (FDA 1990).

Ingrédients non médicinaux: Doivent être choisis parmi les ingrédients de la *Liste des ingrédients non médicinaux acceptables* et respecter les restrictions mentionnées dans cette liste.

Spécifications: Doit respecter les spécifications minimales établies dans le Compendium des monographies.

Références:

BP 2003: The British Pharmacopoeia Commission. London, (UK): Her Majesty's Stationary Office; 2003.

FDA 1994: The USA Department of Health and Human Services: Food and Drug Administration. 21 CFR Part 358. Wart remover drug products for over-the-counter human use, amendment of the final monograph, 1994. [consulté le 13 janvier 2006]. Disponible en ligne à: http://www.fda.gov/cder/otcmonographs/Wart_Remover/wart_remover_amendment_FR_19941123.pdf

FDA 1990: The USA Department of Health and Human Services: Food and Drug Administration. 21 CFR Part 358. Wart remover drug products for over-the-counter human use, final monograph, 1990. [consulté le 13 janvier 2006]. Disponible en ligne à: http://www.fda.gov/cder/otcmonographs/Wart_Remover/wart_remover(358B).pdf

Fiume MZ. Final report on the safety assessment of glycolic acid, ammonium, calcium, potassium, and sodium glycolates, methyl, ethyl, propyl, and butyl glycolates, and lactic acid, ammonium, calcium, potassium, sodium, and TEA-lactates, methyl, ethyl, isopropyl, and butyl lactates, and lauryl, myristyl, and cetyl lactates. International Journal of Toxicology 1998;17 (Suppl. 1):1-3.

Gottschalck TE and McEwen GN, éditeurs. International Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook, 10ième éd. Washington (DC):Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association; 2004.

O'Neil MJ, Smith A, Heckelman PE, Budavari S, éditeurs. Merck Index: An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, & Biologicals, 13ième éd. Whitehouse Station (NJ): Merck & Co., Inc.; 2001.

USP 29: The United States Pharmacopeia and the National Formulary (USP 29/NF 24). Rockville (MD): United States Pharmacopeial Convention, Inc.; 2006.

Annexe 1: Formulations normalisées facultatives de pharmacopées.

Formulation	USP 29	BP 2003
Salicylic acid collodion	X	X
Salicylic acid plaster	X	-

Canada